



CEDUS | EMI

CENTRO AVANÇADO EM DIAGNÓSTICO

NOME: RIVANIA APARECIDA CLEMENTE

CLÍNICA: Dr(a) RODRIGO COELHO RIOS

DATA: 06/10/2017 758534

TOMOGRAFIA MULTISLICE DO ABDOME E PELVE

Realizada aquisição volumétrica em aparelho multislice das cúpulas frênicas à sínfise púbica, orientada por radiografia digital, sem a administração de contraste iodado por via endovenosa ou oral.

Aspectos observados:

Fígado de morfologia e contornos preservados e dimensões aumentadas, com coeficientes de atenuação normais.

Ausência de dilatação das vias biliares intra ou extra-hepáticas.

Vesícula biliar delineada.

Veia porta e seus ramos pérvios, de calibre preservado.

Pâncreas de morfologia, contornos e dimensões preservadas, com parênquima homogêneo.

Rins tópicos, de forma e dimensões conservadas, excretando livremente o meio de contraste.

Milimétrica imagem arredondada de contornos bem definidos, isoatenuante e hipocaptante, localizada na cortical do terço médio do rim direito, cujas diminutas dimensões impedem a mensuração de sua densidade.

Sistemas pielocalicinais e ureteres íntegros, drenando livremente o meio de contraste.

Glândulas adrenais de configuração e espessura habituais.

Baço de morfologia e dimensões preservadas, com coeficientes de atenuação normais.

Aorta abdominal pérvia, de calibre mantido. Calcificações ateromatosas nas artérias aorta abdominal e ilíacas comuns.

Veia cava inferior normoconfigurada, pérvia, de calibre habitual.



CEDUS | EMI

CENTRO AVANÇADO EM DIAGNÓSTICO

NOME: RIVANIA APARECIDA CLEMENTE
CLÍNICA: Dr(a) RODRIGO COELHO RIOS
DATA: 06/10/2017 758534

Ausência de líquido livre ou coleções.

Linfonodo pericaval de dimensões aumentadas, medindo cerca de 15,5 mm.

Esparsas formações diverticulares nas alças de cólon, sem alterações associadas evidentes.

Útero e regiões anexiais sem alterações detectáveis pelo método.

Bexiga de capacidade e contornos conservados.

Flebólitos pélvicos.

Diástase dos músculos reto abdominais com insinuação de gordura mesentérica e alça de delgado.

Impressão: Aspectos tomográficos sugestivos de:

- Hepatomegalia.
- Pequena imagem de aspecto cístico no terço médio do rim direito.
- Ateromatose aortoilíaca.
- Linfonodomegalia pericaval.
- Diverticulose colônica.
- Diástase dos músculos reto abdominais com insinuação de gordura mesentérica e alça de delgado.

Obs.: A impressão diagnóstica é de probabilidade, devendo ser comparada com dados clínicos e laboratoriais, além de outros exames de imagem prévios e subsequentes. Somente o seu Médico tem condições de interpretar corretamente o conjunto de todas estas informações.

Dr. Fabio Marques de Azevedo Filho
CRMMG: 37025

FABIO.FILHO

Lembramos que por ser um método de diagnóstico por imagem, o resultado deste exame não deve ser analisado isoladamente e sim avaliado por seu médico, o qual possui subsídios clínicos e laboratoriais para esclarecimento do diagnóstico.